

ANEXO 7



COPROCULTIVO

Estimado paciente le solicitamos leer con detención la siguiente información antes de tomar la muestra.

- La muestra se obtiene por hisopado rectal que será obtenido en las dependencias del laboratorio por la profesional a cargo.
- Si usted decide tomar la muestra en su domicilio, se le entregará un frasco para depositar una muestra de deposición, el que debe ser llevado al laboratorio antes de 2 horas de emitida la muestra.
- No debe estar en terapia con antibióticos 72 horas antes del examen ni consumiendo laxantes.

Recolección de las muestras:

Para hisopado rectal:

- Siga las instrucciones de la profesional a cargo de toma de muestras.

Deposición fresca:

- Defeque en un recipiente limpio y seco (no mezclar con orina).
- Abra el frasco e introduzca una muestra del tamaño de una nuez y como máximo la mitad. Cierre el tubo herméticamente.
- Colocar el frasco dentro de una bolsa plástica y entregar en el laboratorio antes de dos horas después de emitida la deposición.

Si el paciente utiliza pañal siga las siguientes instrucciones:

- La muestra puede tomarse desde el pañal siempre que no esté mezclada con orina o cremas, de lo contrario, la muestra será recolectada directamente del tracto rectal.
- Debe cambiar el pañal cada vez que su hijo(a) orine, hasta que obtenga la muestra de deposición.

Traslado de la muestra:

- Una vez tomada la muestra de deposición, lleve el frasco a la Unidad de Toma de Muestras antes de 2 horas después de emitida.
- Mantenga la muestra a temperatura ambiente. No refrigere.

SI TIENE DUDAS O NO COMPRENDE CLARAMENTE LAS INDICACIONES, CONSULTE A NUESTRO PERSONAL DE RECEPCION EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES O POR VIA TELEFONICA:

CASA CENTRAL +569722779476, TM MOLINA +569752491402, TM CURICÓ +56934232774, TM SAGRADA FAMILIA +569752393804, TM TENO +56975730525, TM HUALAÑE +56987653082

Responsable: HPC/Agosto 2020/revisión 4.0